

Chap 6. Fonction logarithme népérien

Livres p 283 – Chap 9. Fonction logarithme népérien

1. Définition et propriétés

a. Retour sur la fonction exponentielle

La fonction exponentielle est continue et strictement monotone sur \mathbf{R} ,

de plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc elle établit une bijection de \mathbf{R} dans $]0 ; +\infty[$.

C'est-à-dire que tout élément de \mathbf{R} a une image et une seule par la fonction exp dans $]0 ; +\infty[$, et tout élément de $]0 ; +\infty[$ a un antécédent et un seul par la fonction exp dans \mathbf{R} .

b. Définition de la fonction logarithme népérien

La fonction exponentielle étant bijective de \mathbf{R} dans $]0 ; +\infty[$, elle admet une fonction réciproque, bijective de $]0 ; +\infty[$ dans \mathbf{R} , on l'appelle logarithme népérien et on la note \ln .

Pour tout $x \in \mathbf{R}$, si $y = e^x$, alors $x = \ln(y)$

Pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, si $y = \ln(x)$, alors $x = e^y$.

c. Relation fonctionnelle

Pour tous $x \in]0 ; +\infty[$ et $y \in]0 ; +\infty[$, on a : $\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y)$.

Dém. : On sait que pour tous $X \in \mathbf{R}$ et $Y \in \mathbf{R}$, on a : $e^{X+Y} = e^X \times e^Y$, on pose $X = \ln(x)$ et $Y = \ln(y)$...

d. Propriétés

Bijections réciproques :

Pour tout $x \in]0 ; +\infty[: e^{\ln(x)} = x$

Pour tout $x \in \mathbf{R} : \ln(e^x) = x$

Valeurs particulières :

$e^0 = 1$ donc $\ln(1) = 0$

$e^1 = e$ donc $\ln(e) = 1$

Pour tous $x \in]0 ; +\infty[$ et $y \in]0 ; +\infty[$, on a :

$\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y)$.

$\ln(x^2) = 2 \ln(x)$

et par récurrence, $\ln(x^n) = n \ln(x)$ pour tout $n \in \mathbf{N}$.

$\ln(1/x) = -\ln(x)$

$\ln(x/y) = \ln(x) - \ln(y)$

$\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x)$

2. Etude de la fonction \ln

a. Fonction dérivée

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$, par $f(x) = \ln(x)$, f est dérivable et $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Dém. : Soit $g(x) = e^x$ et $h = g \circ f$, alors $f' \times (g' \circ f) = 1$ or $g' = g$, donc $f' \times h = 1$.

b. Limites

On a : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, donc : $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$.

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$.

c. Tableau de variations

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$, par $f(x) = \ln(x)$, f est dérivable et $f'(x) = \frac{1}{x}$.

$f'(x) > 0$ sur $]0 ; +\infty[$, donc f est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		
$f(x)$			

d. Courbe

Les courbes des fonctions exponentielle et logarithme sont symétriques par rapport à la 1^{ère} bissectrice. L'axe des ordonnées est asymptote verticale à la courbe en 0.

Tangentes en $x = 1$ et en $x = e \dots$

e. Convexité

La fonction logarithme népérien est concave sur $]0 ; +\infty[$.

Application : $\ln(x) \leq x - 1$ sur $]0 ; +\infty[$.

3. Complémentsa. Equations et inéquations

La fonction logarithme établit une bijection de $]0 ; +\infty[$ dans \mathbf{R} donc :

Pour tous $a \in]0 ; +\infty[$ et $b \in]0 ; +\infty[$, $\ln(a) = \ln(b)$ équivaut à : $a = b$.

La fonction logarithme est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$, donc :

Pour tous $a \in]0 ; +\infty[$ et $b \in]0 ; +\infty[$, $\ln(a) < \ln(b)$ équivaut à : $a < b$.

Application : Etude des suites géométriques. (Retour sur l'exercice du village dont la population diminue)

b. Croissances comparées

- Croissances comparées à l'infini :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$ et plus généralement, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$. Dém. : On pose $X = \ln(x)$

- Croissances comparées en zéro :

$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln(x) = 0$ et plus généralement, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \cdot \ln(x) = 0$. Dém. : On pose $X = 1/x$

c. Limite particulière

Autre limite à connaître : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$. Dém : Utilisation du nombre dérivé

d. Dérivée de la composée

La fonction g définie par : $g(x) = \ln(ax + b)$ est dérivable sur son ensemble de définition, et : $g'(x) = \frac{a}{ax+b}$

La fonction g définie par : $g(x) = \ln(u(x))$ est dérivable sur son ensemble de définition, et : $g' = \frac{u'}{u}$

Remarques :

La fonction g définie par : $g(x) = \ln(|x|)$ est dérivable sur \mathbf{R}^* , et : $g'(x) = \frac{1}{x}$

La fonction g définie par : $g(x) = \ln(|u(x)|)$ est dérivable sur son ensemble de définition, et : $g' = \frac{u'}{u}$

e. Dérivée logarithmique (Hors Programme)

Soit f une fonction ne s'annulant pas, on appelle dérivée logarithmique de f , la fonction : $\frac{f'}{f}$

Propriétés :

la dérivée logarithmique de $u \times v$ est : $\frac{u'}{u} + \frac{v'}{v}$

la dérivée logarithmique de $\frac{1}{u}$ est : $-\frac{u'}{u}$

la dérivée logarithmique de $\frac{u}{v}$ est : $\frac{u'}{u} - \frac{v'}{v}$

la dérivée logarithmique de u^2 est : $2 \frac{u'}{u}$

la dérivée logarithmique de u^n est : $n \frac{u'}{u}$

la dérivée logarithmique de \sqrt{u} est : $\frac{1}{2} \frac{u'}{u}$

4. Fonctions logarithme et exponentielle de base a (Hors Programme)

a. Fonction logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif différent de 1.

On appelle fonction logarithme de base a la fonction notée \log_a définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$

Propriétés : $\log_a = k \times \ln$
 $\log_a(a) = 1$

Cas particuliers : Si $a = e$, on retrouve le logarithme népérien
 Si $a = 10$, on obtient le logarithme décimal, noté plus simplement \log .

b. Fonction exponentielle de base a

Soit a un réel strictement positif différent de 1.

On appelle fonction exponentielle de base a la fonction notée \exp_a réciproque de la fonction logarithme de base a .

Notation : Pour tout réel x , on note $\exp_a(x) = a^x = e^{x \ln(a)}$.

c. Applications du logarithme décimal

En Physique : Les décibels

En Chimie : Le pH

En Economie : Le papier semi-logarithmique

En Mathématiques : La règle à calcul